



衛生福利部雙和醫院

(委託臺北醫學大學興建經營)


對於腹股溝疝氣我該選擇傳統手術開刀治療，還是選擇微創型腹腔鏡疝氣修補手術？

中華民國114年04月 泌尿科編制



◆ 簡介

外科常見的疝氣多由於肌肉肌膜薄弱或先天腹壁缺損所造成。目前疝氣的治療建議以手術為主，因膨出的器官於疝氣囊過久會導致水腫，腫起的器官比疝氣洞還大時，僅能以外科治療協助復位，時間過久器官會因卡住而壞死，甚至造成腹膜炎及敗血性休克。隨著手術日新月異，由傳統的疝氣修補手術，延伸出腹腔鏡疝氣修補手術，或全腹膜外、達文西機械手臂等方式，依照病患種況給予建議。




◆ 治療選項

	① 傳統修補手術 傳統的疝氣修補手術的發展，是醫師自體表皮膚前方切開進入，找到自腹股溝薄弱處突出來的疝氣囊，將疝氣囊與精索分離、裁剪或是推回去腹腔內。腹壁的薄弱處以自身的週邊組織彼此拉緊縫合作為體壁缺損的補強，或是鋪上一層人工網膜。
	② 內視鏡手術 腹腔鏡疝氣修補手術，是利用腹腔鏡器械經由下腹部的小傷口在肌肉筋膜缺損處，鋪上一層人工網膜，以達到無張力式修補的目的。



◆ 關於內視鏡

由肚臍附近將內視鏡插入並連接到攝影機藉以觀察腹腔內疾病。通常在全身麻醉下進行。先以細針管將二氧化碳注入腹腔內使腹腔膨脹，稱為氣腹法。等腹腔壓力到一定程度時，



於肚臍下部插入腹腔鏡導管並置入腹腔鏡，此處的導管直徑為 1 公分。手術器械需由另外的器械導管置入，導管直徑為 0.5 公分，較複雜的手術需要第三個器械導管進行手術。

◆ 治療選項比較表

	傳統修補手術	內視鏡手術
手術時間	1-2 小時	1 小時
恢復時間	4 週	1 週
疼痛感	☹☹☹☹	☹
可能之併發症	較高 機率 疝氣復發	因採全身麻醉，心肺功能不佳者可能有風險
麻醉方式	半身麻醉	全身麻醉
住院天數	3-4 天	2-3 天
優點	• 適用於不適合全身麻醉者	• 較低疝氣復發率 • 適合同時進行雙側疝氣修補
缺點	• 傷口較大且長，可能需要使用除疤產品 • 若腹壁缺損大，復發機率也大	• 嵌頓型疝氣或過大之疝氣不適合使用 • 手術技巧較高
價格	健保給付	3-6 萬 (達文西手術費用 12-15 萬)



◆ 理解程度

	是	否	不清楚
傳統修補手術與內視鏡手術比較，是否有更長的手術時間？	☐	☐	☐
傳統修補手術與內視鏡手術比較，是否更加疼痛？	☐	☐	☐
心肺功能不佳者，施行內視鏡手術麻醉風險是否較高？	☐	☐	☐

◆ 選擇偏好

請依據您個人的偏好來勾選以下合適的項目

重視程度	重視-----普通-----不重視				
手術時間短	5	4	3	2	1
恢復時間短	5	4	3	2	1
術後疼痛程度較低	5	4	3	2	1
需要負擔的費用	5	4	3	2	1
對工作的影響	5	4	3	2	1
疾病復發率	5	4	3	2	1
其他_____	5	4	3	2	1
其他_____	5	4	3	2	1



衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)
Taipei Medical University - Shuang Ho Hospital,
Ministry of Health and Welfare

◆ 您的選擇

依照目前您的考量，您比較傾向選擇的治療計畫是

☐ 傳統修補手術

☐ 內視鏡手術

☐ 尚未決定

◆ 其他疑問

針對醫師的說明，您是否還有任何疑問？

如果仍有疑問，歡迎您寫下來或說出來與您的醫師或個管師討論。



衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)

永續 · 共融 · 創新

235 新北市中和區中正路 291 號

代表號：02-22490088

官方網站：shh.tmu.edu.tw